

REGENIN[®]S

*Anti-Cellulite Ampule
Best Cellulite Expert
Next Generation Peptide*

 NineBiopharm



나인바이오팜(주)

R&D

펩타이드 소재 개발 전문
기업으로서 의약품, 의료
기기, 화장품에 적용 가능
한 다양한 펩타이드 기반
바이오 소재 개발

Peptide

독자적인 펩타이드 개발
플랫폼 기술을 통해 다수
의 생물유래 펩타이드 라
이브러리(항균, 미생물,
독, 식물 유래 펩타이드
등) 확보

Platform

유효 펩타이드 발굴 및 상
용화에 이르는 독자적인
펩타이드 소재 개발 플랫
폼 체인 보유

리제닌®S 제품 특징



병원에서 1차 케어 & 시술 후 2차 홈케어 앰플 & 홈케어 크림, 2종 구성

※ 리제닌®S 크림은 병원에서의 시술 후 홈케어가 가능한 제품으로 시술 효과 극대화에 도움을 줍니다.



빠른 흡수, 뛰어난 효과
높은 만족도




안전한 셀룰라이트 감소 효과
간편한 시술



높은 피부 투과율로
확실한 효과

리제닌®S
지방세포
축소효과

주변 피부세포에 영향 ZERO! 오직 지방만 분해시킵니다!





리제닌®S는 지방 세포만을 표적으로 하여 작용하기 때문에 주변 피부세포는 그대로 유지하면서도 불필요한 지방세포를 줄이거나 더 커지는 것을 예방하여 셀룰라이트 케어에 탁월한 제품입니다.

< 리제닌®S 사용 후, 축소된 지방세포 모습 >

혈행개선으로 일시적인 눈속임? 지방세포 축소로 확실한 효과!

리제닌®S에 함유된 **Regentide®**는 나인바이오팜의 독자적인 기술로 새롭게 개발된 올리고 펩타이드 소재의 신개념 지방분해 효능 원료입니다. 특히 높은 피부 투과율로 피부에 빠르게 흡수되어 지방을 분해하는 효능이 있습니다.

독자개발 지방 분해 펩타이드
Regentide®



지방분해 효과 증가
(Lipolysis)





리제닌®S는 지방세포(Adipocyte)의 지질 방울(Lipid droplet)에 직접 작용하여 HSL(호르몬 민감성 저단백질 분해효소)과 ATGL (Adipose triglyceride lipase), PLIN-1(페릴리핀 단백질)의 분비를 촉진함으로써 지방분해 활성화를 증가시키고 선택적 지방 분해를 통해 지방 세포의 크기를 감소시키는 기능을 합니다.

특히 기존의 지방분해 제품이 지방세포의 주변 피부세포까지 파괴하여 탄력이 떨어지는 것과 달리 리제닌®S는 지방세포에 특이적 신호 전달을 통해 지방을 감소시켜 피부의 탄력이 떨어지지 않고(처짐현상 없음) 안전합니다.

리제닌®S 피부투과 효능


도포 만으로도 진피까지!

빠르고 깊게 흡수해 지방을 효과적으로 분해합니다!



리제닌®S 시술 부위

한 부위 당, 한 바이알 사용



※ 권장 사용량으로 환자의 상태, 시술 방법에 따라 실제 사용량이 상이할 수 있습니다.




가장 높은 효능을 보이는 핵심 성분, 고순도 펩타이드를 단독으로 함유하여
셀룰라이트 감소 효과가 탁월합니다.


임상시험 결과

이중턱 리프팅 부피 개선

이중턱 리프팅
부피 개선 효과 **20.5%**



이중턱 리프팅 효과(부피) 임상시험 결과 (출처 : (주)스킨메드 임상시험센터, 21명, *p<0.05)




안면부(이중턱 부위) 8주 사용, 임상시험 대상 평균 연령 40세


임상시험 결과

이중턱 리프팅 부피 개선

이중턱 리프팅
볼륨 개선 효과 **34.4%**





이중턱 리프팅 효과(볼륨) 임상시험 결과 (출처: (주)스킨메드 임상시험센터, 21명, *p<0.05)



임상시험 결과

진피 & 피하지방층
경계면 길이 감소

진피 & 피하지방층
경계면 길이 감소 **16.6%**




진피와 피하지방층 경계면 길이 평가 (출처: (주)스킨메드 임상시험센터, 20명, *p<0.05)
대퇴부(허벅지 부위) 8주 사용, 임상시험 대상 평균 연령 36세

임상시험 결과

셀룰라이트 감소 육안 평가

육안평가 결과
셀룰라이트 감소 **7.2%**




일시적 셀룰라이트 감소 효과 육안 평가 결과 (출처 : (주)스킨메드 임상시험센터, 20명, *p<0.05)
대퇴부(허벅지 부위) 8주 사용, 임상시험 대상 평균 연령 36세

임상시험 결과

피부결 (거칠기)
개선 효과

피부결 (거칠기)
개선 효과 **6.1%**



피부결 (거칠기) 개선 평가 결과 (출처 : (주)스킨메드 임상시험센터, 20명, *p<0.05)
대퇴부(허벅지 부위) 8주 사용, 임상시험 대상 평균 연령 36세

REGENIN[®]S



NineBiopharm Co., Ltd.

#503, Ace Gwanggyo Tower 2, 91, Changnyong-daero 256 beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Tel +82-31-304-9667
Fax +82-31-304-9666

E-mail nbpharm@ninebiopharm.com
Website www.regenin.co.kr